

# Richtig Trockenstellen mit dem internen Versiegler von Zoetis

## Der Versiegler ist:

### Einfach

Ist leicht applizierbar und am Ende der Trockenstehperiode leicht ausmelkbar.

### Wirksam

Reduziert das Risiko von Neuinfektionen und klinischer Mastitis in der Frühlaktation.

### Dauerhaft

Verbleibt während der gesamten Trockenstehperiode in der Zitze.

### Bewährt

Wird seit 17 Jahren in der Praxis angewendet; zahlreiche Studien und Praxisberichte dokumentieren den Erfolg.




Bei Zoetis stärken wir die Tiergesundheit durch Innovation und Fortschritt. Seit über 70 Jahren forschen wir für Tierärzte und Landwirte und sind der Partner an Ihrer Seite. So sind wir zum größten Tiergesundheitsunternehmen der Welt geworden.


Unser umfangreiches Mastitis-Portfolio hilft Ihnen dabei der **Mastitis vorzubeugen** und sie richtig und **effektiv zu behandeln**. Von Produkten für die Laktations- und Trockenstehphase über Dippmittel bis zu Medikamenten zur systemischen Anwendung bieten wir alles, um Ihre Bestände umfassend während aller Produktionsphasen zu betreuen.

# Richtig Trockenstellen


## Handlungsempfehlung




**1 Desinfizieren** Sie die Zitzen spitze mit einem Desinfektionstuch. Verwenden Sie ein Tuch pro Zitze. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Tuch sauber bleibt.




**2** Falls Sie zusätzlich einen **antibiotischen Trockensteller** benötigen, bringen Sie eine gesamte Eutertube des Trockenstellers pro Euterviertel ein. **Desinfizieren** Sie die Zitzen erneut.




**3** Greifen Sie die **Zitzenbasis** mit zwei Fingern fest am Übergang ins Euter und biegen Sie die Zitze leicht zur Seite.



**4** Führen Sie den **internen Zitzenversiegler** in die Zitze ein und entleeren Sie seinen Inhalt langsam unterhalb der Stelle, an der Sie die Zitze zusammendrücken. **Verwenden Sie eine komplette Tube pro Viertel.** Nicht einmassieren!



**5** **Dippen** Sie die Zitze zu über 90 % in ein Desinfektionsmittel. Markieren Sie die behandelten Kühe und lassen Sie diese 30 Minuten lang stehen, damit sich die Zitze schließen kann.



**Sehr leicht auszumelken!**

Am Ende der Trockenstehperiode wird der **Zitzenversiegler** kräftig per Hand ausgemolken. Umfassen Sie dazu fest die Zitzenbasis oberhalb des Versieglerpfropfs, um den Zugang zum Euterviertel abzuklemmen. **Melken Sie den Zitzenversiegler mit der Hand aus.**